

# PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH KHEO TRONG CẤP CỨU

## ***I/ Bệnh nhân đến trước 6 giờ ( kể từ khi chấn thương)***

1. Có dấu hiệu rõ ràng tổn thương động mạch khoeo : mạch chày trước và sau không bắt được, bàn chân tím lạnh, nhấp nháy móng chậm hơn 2 giây.
  - Dấu hiệu tổn thương vùng gối: gãy mâm chày, đứt dây chằng chéo, trật khớp gối, bầm máu lan tỏa vùng khoeo
    - Tiến hành mổ thám sát nối ghép động mạch khoeo.
2. Dấu hiệu không rõ ràng : mạch chày trước và sau nhẹ khó bắt , bàn chân lạnh hơn bên lành nhưng có dấu hiệu tưới máu chi ( có thể do tuần hoàn bàng hệ.)
  - Siêu âm Doppler mạch máu vùng khoeo: Nếu có tắc mạch → chỉ định mổ.
  - Dấu hiệu tổn thương vùng gối là một yếu tố giúp quyết định có can thiệp phẫu thuật, nếu cơ chế chấn thương mạnh và tổn thương xương, day chằng nặng nên quyết định mổ sớm

## ***II/ Bệnh nhân đến sau 6 giờ***

- Tùy thuộc vào chỉ số MESS.
- Nếu chỉ số  $MESS > 8$  : đoạn chi
  - $MESS \leq 8$  :
    - Có dấu hiệu tổn thương mạch máu rõ và tổn thương vùng gối
      - mổ thám sát, ghép nối mạch máu, đề phòng tuột huyết áp
    - Dấu hiệu tổn thương mạch khoeo không rõ ràng, Chi còn tưới máu (có thể do tuần hoàn bàng hệ). Tổn thương vùng gối nhẹ
      - Siêu âm Doppler hay DSA. Nếu có tổn thương, mổ thám sát, khâu nối. Nếu không tổn thương, theo dõi tiếp