


## 44. SỐT SAU MỔ LẤY THAI

### I. Định nghĩa

Sốt sau mổ lấy thai là sốt từ trên 24 giờ sau khi mổ với thân nhiệt từ 38°C trở lên. Đây là triệu chứng do nhiều nguyên nhân khác nhau với mức độ nặng nhẹ khác nhau.

### II. Các nguyên nhân gây sốt sau mổ lấy thai



### III. Các dấu hiệu và xử trí

#### 1. Nhiễm khuẩn vết mổ

- Dấu hiệu chính: vết mổ sưng, có dịch tiết là máu hay mủ, tấy đỏ quanh vết khâu.
- Xử trí: cắt chỉ cách quãng, dẫn lưu thoát dịch. Rửa vết mổ bằng dung dịch sát khuẩn và thay băng tối thiểu ngày 2 lần.

## 2. Căng tức vú

- Dấu hiệu chính: vú căng đau cả hai bên, xuất hiện muộn 3 – 5 ngày sau mổ lấy thai.
- Xử trí:
  - + Đắp mát, hút sữa, giữ vệ sinh vùng vú.
  - + Nếu người mẹ cho con bú, khuyến khích tiếp tục cho con bú.

## 3. Tắc ống dẫn sữa

- Đắp mát, hút sữa.
- Thuốc giảm tiết sữa.

## 4. Abces vú

- Kháng sinh, giảm đau.
- Rạch abces, dẫn lưu.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. W.D. Hager, J.W. Larsen, Postoperative Infections: Prevention and Management, Chapter 11 in Te Linde's Operative Gynecology, 10<sup>th</sup> edit. 2008,190-222.