

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG ÁP XE TÁI PHÁT

1. CHẨN ĐOÁN:

1.1 Lâm sàng:

- Tiến triển nhanh từ nhẹ đến sung nhiều
- Đau dữ dội khi gõ và sờ
- Răng bị lung lay và trôi cao hơn
- Trường hợp nặng, bệnh nhân bị sốt.

1.2 Cận lâm sàng: X-Quang :có vùng thấu quang quanh chóp.

2 ĐIỀU TRỊ:

- Thuốc:Tùy thực tế trên lâm sàng có thể lựa chọn thuốc điều trị cho phù hợp.
- Thuốc dùng đường uống ,liều thường dùng cho người lớn:

- **Kháng sinh:**

- Amoxicillin 500mg+AcidClavulanic125mg: 1viên x 3lần/ngày.
- Spiramycin750000IU + Metronidazole125mg: 2 viên x 3 lần/ngày.

- **Kháng viêm:**

- Prednisone 5mg: 1 viên × 3 lần/ngày.
- Dexamethasone 0,5mg: 1 viên × 3 lần/ngày.
- Methylprednisolone 16mg: 1 viên/ngày (sáng).
- Lysozym 90mg: 1viên x 3 lần/ngày.

- **Giảm đau:**

- Paracetamol 500mg: 1viên x 3-4 lần/ngày.

- **Kháng viêm & giảm đau:**

Ibuprophen 200 mg+paracetamol 325mg: 1viên x 3 lần/ngày.

Thời gian dùng thuốc từ 5-7 ngày.

Sau đó điều trị như điều trị viêm quanh chóp mãn

3. SAU ĐIỀU TRỊ :

- Hướng dẫn vệ sinh răng miệng
- Tái khám răng định kỳ.