

TRỤT NƯỚC/ THIẾU HỒNG MÔ MỀM

1. CHẨN ĐOÁN:

1.1. Triệu chứng:

- Nước trọt > 2mm vùng cổ răng.
- Thiếu mô, lép niêm mạc vùng mất răng
- Ê buốt răng kéo dài.
- Mất thẩm mỹ ở nước.

1.2. Chẩn đoán xác định: Trọt nước / thiếu hồng mô mềm.

2. ĐIỀU TRỊ:

2.1. Chỉ định:

- Phẫu thuật ghép mô liên kết (tự thân).

2.2. Phác đồ điều trị :

- Khám và làm bệnh án.
- Xét nghiệm máu: công thức máu, TS, TC (có thể có TQ, TCK, thử đường huyết nếu cần) (tùy theo cơ địa bệnh nhân mà có chỉ định cần thiết)
- Chụp phim X-quang.
- Hướng dẫn vệ sinh răng miệng.
- Cạo vôi răng.
- Gây tê tại chỗ vùng cho mô bằng Lidocain 2%.
- Cắt, tách mô liên kết bằng dao 15C, lấy mô liên kết.
- Khâu vùng cho bằng silk 3.0/ 4.0.
- Gây tê tại chỗ vùng nhận.
- Cắt tách vạt vùng nhận.
- Ghép mô liên kết.
- Khâu bằng chỉ tiêu 4.0 và Silk 4.0.
- Thời gian điều trị 01 ngày.
- Tái khám sau: 07 ngày.

1.1.3. Thuốc dùng trong điều trị: Tùy thực tế trên lâm sàng, có thể lựa chọn thuốc điều trị cho phù hợp.

- Kháng sinh:

- **Cephalexin 500mg:**

- Liều thường dùng cho người lớn: 1 viên × 3 lần/ ngày (uống).
- Dùng từ 5 - 7 ngày tùy từng trường hợp.

- **Spiramycin 750.000 UI + Metronidazol 125mg:**

- Liều thường dùng cho người lớn: 2 viên × 3 lần/ ngày (uống).
- Dùng từ 5 - 7 ngày tùy từng trường hợp.

- **Kháng viêm:**
 - **Dexamethasone 0,5mg:**
 - Liều thường dùng cho người lớn: 1 viên × 3 lần/ ngày (uống).
 - Dùng khoảng 3-6 ngày tùy từng trường hợp nhiễm trùng nặng hay nhẹ.
 - Chống chỉ định: Loét dạ dày, tá tràng, cao huyết áp, bệnh tuyến giáp....
- **Giảm đau:**
 - **Paracetamol 500mg (viên nén, viên sủi):**
 - Liều thường dùng cho người lớn: 1 viên × 3 lần/ ngày (uống).
 - Dùng khoảng 3 ngày hoặc nhiều ngày hơn tùy từng trường hợp.
 - **Paracetamol 325mg + Ibuprofen 200mg:**
 - Liều thường dùng cho người lớn: 1 viên × 3 lần/ ngày (uống).
 - Dùng khoảng 3 ngày hoặc nhiều ngày hơn tùy từng trường hợp.
 - Chống chỉ định: Loét dạ dày, tá tràng, hội chứng polyp mũi, tiền sử phù mạch...
- Kem đánh răng.
- Nước súc miệng