

TÚI NHA CHU SÂU, TIÊU XƯƠNG/THIẾU HỒNG XƯƠNG < 2 VÁCH

1. CHẨN ĐOÁN:

1.1. Triệu chứng:

- Xương tiêu, mất vách xương quanh chân răng (<2 vách).
- Tiêu xương theo chiều ngang, dọc.
- Mất thẩm mỹ.

1.2. Chẩn đoán xác định: Nha chu viêm.

2. ĐIỀU TRỊ:

2.1. Chỉ định:

- Phẫu thuật ghép xương.

2.2. Phác đồ điều trị:

- Khám và làm bệnh án.
- Xét nghiệm máu: công thức máu, TS, TC (có thể có TQ, TCK, thử đường huyết nếu cần) (tùy theo cơ địa bệnh nhân mà có chỉ định cần thiết)
- Chụp phim X-quang.
- Hướng dẫn vệ sinh răng miệng.
- Cạo vôi răng.
- Gây tê tại chỗ bằng Lidocain 2%.
- Bóc tách vạt bộc lộ sang thương bằng cây tách bóc.
- Ghép xương Porites.
- Khâu Silk 3.0/ 4.0.
- Thời gian điều trị 01 ngày.
- Tái khám sau: 07 ngày.

1.1.4. Thuốc dùng trong điều trị : Tùy thực tế trên lâm sàng, có thể lựa chọn thuốc điều trị cho phù hợp.

- Kháng sinh:

- **Cephalexin 500mg:**

- Liều thường dùng cho người lớn: 1 viên × lần/ngày (uống).
- Dùng khoảng 7 ngày tùy từng trường hợp.

- **Spiramycin 750.000 UI + Metronidazol 125mg.**

- Liều thường dùng cho người lớn: 2 viên x 3 lần/ngày (uống).
- Dùng từ 5 - 7 ngày tùy từng trường hợp.

- Kháng viêm:

- **Dexamethasone 0,5mg:**

- Liều thường dùng cho người lớn: 1 viên x lần/ngày (uống).

- Dùng từ 3-6 ngày tùy từng trường hợp nhiễm trùng nặng hay nhẹ.
- Chống chỉ định: Loét dạ dày, tá tràng, cao huyết áp, bệnh tuyến giáp....
- **Giảm đau:**
 - **Paracetamol 500mg (viên nén, viên sủi):**
 - Liều thường dùng cho người lớn: 1 viên × 3 lần/ ngày (uống).
 - Dùng khoảng 3 ngày hoặc nhiều ngày hơn tùy từng trường hợp.
 - **Paracetamol 325mg + Ibuprofen 200mg:**
 - Liều thường dùng cho người lớn: 1 viên × 3 lần/ ngày (uống).
 - Dùng khoảng 3 ngày hoặc nhiều ngày hơn tùy từng trường hợp.
 - Chống chỉ định: Loét dạ dày, tá tràng, hội chứng polyp mũi, tiền sử phù mạch....
- Kem đánh răng.
- Nước súc miệng.