

VIÊM TAI GIỮA CẤP TÍNH

Có nhiều mức độ khác nhau:

- Viêm tai giữa xuất tiết
- Viêm tai giữa thanh dịch thường gặp ở trẻ em
- Viêm tai giữa sung huyết
- Viêm tai giữa mũ

NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH:

- Nhiễm trùng đường hô hấp trên
- Hoặc rối loạn chức năng vòi nhĩ.
- Vi khuẩn thường gặp: *Streptococcus*, *Pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*... Ở trẻ sơ sinh thường gặp nhất là vi khuẩn gram âm: *Escheria coli*, *enterococci*...

TRIỆU CHỨNG:

- Cảm giác đầy tai,
- Nghe kém
- ù tai, chóng mặt, mất thăng bằng
- Soi tai: màng nhĩ viêm đỏ, sung huyết, hoặc có dịch trong hòm nhĩ. Nếu không điều trị không kịp thời và đúng phương pháp sẽ dẫn tới chảy mũ (thủng nhĩ).

ĐIỀU TRỊ:

Kháng sinh: Có thể sử dụng 1 trong các loại sau	- Augmentine - Cefuroxime (Zinnat ; Zinmax;...) - Cefixime (Cexim;...)
Kháng viêm:	- Steroide: + Prednisolone 5mg; + Methylprednisolone (Medrol 4mg, 16mg)
Giảm đau:	- Paracetamol 30 -40mg/kg/24giờ

XXX