

## **NHỌT ỚNG TAI** **(Bệnh tai ngoài nhiễm trùng)**

### **ĐẠI CƯƠNG**

- Là một tình trạng viêm cấp của tai ngoài
- Nhọt thường nằm ở vị trí sau trên và ở 1/3 ngoài ống tai
- Tuyến bã vùng da ống tai bị viêm tắc
- Tác nhân gây bệnh: S. aureus

### **TRIỆU CHỨNG**

- Đau tai
- Chảy mủ tai
- Nghe kém (nếu nhọt làm bít ống tai)
- Nhọt nằm vùng cửa tai, ống tai phù nề, đỏ

### **ĐIỀU TRỊ**

- Rửa dẫn lưu
- Thuốc

Kháng sinh (Có thể sử dụng 1 trong những nhóm sau)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Oxacilin (Bristopen), liều lượng 500mg × 3 lần/ngày</li><li>▪ Hoặc cephalosporin thế hệ 1 (cefadroxil, cefalexin,...), liều lượng 500mg × 3-4 lần/ngày</li><li>▪ Hoặc cephalosporin thế hệ 2 (cefaclor, zinnat,...), liều lượng 500mg × 2 lần/ngày</li></ul>
Giảm đau	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ acetaminophen (panadol, efferalgan,...)</li><li>▪ liều lượng 500mg × 3-4 lần/ngày</li></ul>

XXX