

DIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC THẾ GIỚI

An toàn khi sử dụng Codein ở trẻ em

Nhiều động thái về mặt quản lý các thuốc chứa codein đã được nhiều cơ quan quản lý dược phẩm trên thế giới đưa ra.

Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA Hoa Kỳ) chống chỉ định các thuốc chứa codein cho trẻ dưới 12 tuổi với bất kỳ chỉ định nào (tháng 4/2016) và cho trẻ dưới 18 tuổi với chỉ định giảm đau sau phẫu thuật cắt amidal hoặc nạo V.A. (tháng 5/2013). Gần đây nhất, FDA tiếp tục giới hạn chỉ định các thuốc chứa codein điều trị ho và cảm lạnh cho trẻ dưới 18 tuổi. Tương tự, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) đã giới hạn việc sử dụng các thuốc chứa codein cho trẻ dưới 12 tuổi để điều trị ho và cảm lạnh, đồng thời, chống chỉ định các thuốc này cho trẻ dưới 18 tuổi sau phẫu thuật cắt amidal hoặc nạo V.A. Cơ quan Quản lý Dược phẩm Úc (TGA) cũng chống chỉ định codein cho trẻ dưới 12 tuổi với bất kỳ chỉ định nào và cũng không cho phép trẻ 12 - 18 tuổi sử dụng thuốc này sau phẫu thuật cắt amidal hoặc nạo V.A. Còn sau đây là các khuyến cáo của MARC:

- **Chống chỉ định thuốc chứa codein cho trẻ dưới 12 tuổi với tất cả các chỉ định.**
- **Chống chỉ định thuốc chứa codein cho trẻ dưới 18 tuổi với chỉ định giảm đau sau phẫu thuật cắt amidal hoặc nạo V.A.**
- **Chống chỉ định thuốc chứa codein cho trẻ dưới 18 tuổi có tổn thương chức năng hô hấp.**
- **Chống chỉ định thuốc chứa codein cho trẻ dưới 18 tuổi với chỉ định ho.**

Các thuốc có chứa hoạt chất Codein đang sử dụng tại nhà thuốc bệnh viện Tân Bình :

- Neocodion
- Terpincodein
- Efferalgan codein

DS Nguyễn Thị Thùy Vân

Nguồn: Cảnh Giác Dược