

ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC THẾ GIỚI

Cảnh báo tăng nguy cơ đứt hoặc rách động mạch chủ ở bệnh nhân sử dụng kháng sinh fluoroquinolon

Cuộc rà soát của FDA chỉ ra các kháng sinh fluoroquinolon có thể làm tăng nguy cơ mắc biến cố đứt hoặc rách động mạch chủ hiếm gặp nhưng nghiêm trọng. Động mạch chủ bị rách hay còn gọi là tách thành động mạch chủ, hoặc đứt phình động mạch chủ có thể dẫn tới xuất huyết nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Các biến cố này có thể xảy ra khi sử dụng các fluoroquinolon tác dụng toàn thân đường uống hoặc tiêm.

Các kháng sinh fluoroquinolon được phê duyệt để điều trị các nhiễm khuẩn do vi khuẩn gây ra và đã được sử dụng trên 30 năm. Các kháng sinh này có tác dụng diệt khuẩn hoặc ngừng sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh. Nếu không được điều trị, một số loại nhiễm khuẩn có thể lan rộng và dẫn tới các vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe.

Khuyến cáo :

- Tránh kê đơn fluoroquinolon ở bệnh nhân phình động mạch chủ hoặc có nguy cơ phình động mạch chủ, như bệnh nhân xơ vữa động mạch ngoại biên, tăng huyết áp, một số bệnh di truyền như hội chứng Marfan và Ehlers-Danlos, và bệnh nhân cao tuổi
- Chỉ kê đơn fluoroquinolon khi không có biện pháp điều trị khác
- Khuyến cáo tất cả bệnh nhân gọi hỗ trợ y tế ngay nếu có triệu chứng phình động mạch chủ
- Ngừng fluoroquinolon ngay nếu bệnh nhân gặp biến cố bất lợi nghi ngờ liên quan đến phình động mạch chủ hoặc tách thành động mạch chủ

DS. Nguyễn Thị Thùy Vân

Nguồn: trung tâm DI & ADR Quốc gia